

Линейная алгебра
Системы линейных уравнений

Глеб Карпов

МНаД ФКН ВШЭ

Система линейных уравнений

- Привычный вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Другие формы СЛУ

- Матричная форма

✓ ✓ $P_{B \rightarrow S} [x]_B = [x]$


$$a_1 \ a_2 \ a_n \\ A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$A \cdot x = b$$

rhs
right-hand side

- Векторная форма

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b,$$



где a_i — i -й столбец матрицы A

Другие формы СЛУ

- Матричная форма

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$A \cdot x = b$$

- Векторная форма

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b,$$

где a_i — i -й столбец матрицы A

- Расширенная форма

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Элементарные преобразования строк

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Существует три типа элементарных преобразований строк:


1. **Перестановка строк:** поменять местами две строки матрицы
2. **Умножение на скаляр:** умножить строку на ненулевой скаляр α $[a_{k1} \dots a_{kn} | b_k] \cdot \alpha$
3. **Замена строки:** заменить строку k её суммой с константным множителем строки j ; все остальные строки остаются неизменными

$$A[k, :] = A[k, :] + \alpha \cdot A[j, :]$$

Метод Гаусса (приведение к ступенчатому виду)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \cancel{c} & d \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c & d \end{pmatrix} - \frac{c}{a} \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 0 & d - \frac{cb}{a} \end{pmatrix}$$

1. Найти самый левый ненулевой столбец матрицы
2. Убедиться, применяя преобразования типа 1 (перестановка строк), если необходимо, что первый (верхний) элемент этого столбца ненулевой. Этот элемент называется ведущим элементом или просто ведущим
3. Занулить все ненулевые элементы под ведущим, добавляя (вычитая) подходящее кратное первой строки к строкам номер $2, 3, \dots, m$



Слайд для записи

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) -3R_1 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \end{array} \right) \left(-\frac{1}{4} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \end{array} \right) +3R_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{array} \right)$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Backward process:

$$2x_3 = -4$$

$$x_3 = -2$$

$$\left| \begin{array}{l} 0x_1 + 1x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_2 = -1 - 2x_3 = -1 + 4 = 3 \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 = 1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 - 6 + 6 = 1 \end{array} \right.$$

$$B = \begin{bmatrix} 2, 1+x \\ v_1, v_2 \end{bmatrix}$$

$$g(x) = 5 + 6x = 5 \cdot 1 + 6 \cdot x$$

$$S = \{1, x\}$$

$$v_1 = 2 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$[v_1]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad [v_2]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = 1+x = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x$$

$$-\frac{1}{2} \cdot 2 + 6(1+x) = 5 + 6x \quad \checkmark$$

Примеры

$$P_{B \rightarrow S} [x]_B = [x]_S$$

$$P_{B \rightarrow S} = \begin{bmatrix} [v_1]_S & [v_2]_S \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 5 \\ 0 & 1 & | & 6 \end{pmatrix}$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 6$$

$$2x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_2 = 2.5 - 3 = -\frac{1}{2}$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Ступенчатый вид

1. Все нулевые строки (т.е. строки со всеми элементами равными 0), если они есть, находятся ниже всех ненулевых строк

Для ненулевой строки назовём самый левый ненулевой элемент ведущим элементом. Тогда второе свойство ступенчатого вида можно сформулировать следующим образом:

2. Для любой ненулевой строки её ведущий элемент строго правее ведущего элемента в предыдущей строке.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Diagram illustrating the step-by-step reduction of a matrix to row echelon form. The matrix is:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

The first row is the pivot row for the first column. The leading 1 is highlighted in a purple box. The second row is the pivot row for the second column. The leading 1 is highlighted in a purple box. The third row is the pivot row for the third column. The leading 1 is highlighted in a purple box. The fourth row is a zero row and is not shown. The right side of the matrix shows the transformed vector: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. The matrix is reduced to row echelon form, where the leading 1s are highlighted in purple boxes and the zero entries in the pivot columns are circled in red.

Ступенчатый вид

$x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Некоторые столбцы НЕ содержат ведущих элементов. Переменные, соответствующие им — **свободные переменные**

- Решение системы

$$1 \cdot x_5 = 3 \Rightarrow x_5 = 3$$

$$1 \cdot x_3 + 5x_4 = 2 \Rightarrow x_3 = 2 - 5x_4$$

$$x_1 + 2x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 1 - 2x_2$$

Общее решение

- Финально, общее решение СЛУ

$$x = \begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 \\ x_2 = \text{free} \\ x_3 = 2 - 5x_4 \\ x_4 = \text{free} \\ x_5 = 3 \end{cases}, \quad \bigvee x_2, x_4 \in \mathbb{R}$$

Общее решение

- Финально, общее решение СЛУ

$$x = \begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 \\ x_2 = \text{free} \\ x_3 = 2 - 5x_4 \\ x_4 = \text{free} \\ x_5 = 3 \end{cases}, \quad x_2, x_4 \in \mathbb{R}$$

- Векторная форма общего решения

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{H} x_2, x_4 \in \mathbb{R}$$